

Buňky Calu-3 | 305032

Obecné informace

Description

Buňky Calu-3 jsou lidskou epiteliální buněčnou linií odvozenou z adenokarcinomu plic 25letého muže v roce 1975. Tyto buňky vykazují epiteliální morfologii a vyznačují se schopností vytvářet těsné spoje, desmosomy a mikrovily, což odráží strukturální rysy plicního epitelu. Buňky Calu 3 se vyznačují zejména vysokou mírou sekrece mucinů, což jsou glykoproteiny podílející se na ochraně a promazávání plicních dýchacích cest, což z nich činí vhodný in vitro model pro studium biologie epitelu dýchacích cest, včetně produkce mucinů, jejich sekrece a její regulace.

Buňky lidského plicního adenokarcinomu Calu-3 se používají při objevování a vývoji léčiv, zejména pro hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a vylučování (ADME) inhalačních léčiv. Jejich schopnost vytvářet polarizovanou monovrstvu při kultivaci na propustných nosičích je předurčuje ke studiu transportu léčiv a účinků léčiv na epitel dýchacích cest.

Buňky Calu 3, odvozené z buněk lidského karcinomu plic, jsou zvláště důležité pro studium epiteliálních buněk dýchacích cest a jejich úlohy v respiračních podmínkách. Tyto buňky pocházejí z bronchiálních podslizničních žláz a využívají se v modelech buněčných kultur, které napodobují lidské dýchací cesty, a poskytují tak poznatky o funkci dýchacích cest, poškození epitelových buněk, poškození plic a studiu onemocnění, jako je cystická fibróza nebo SARS.

Studium buněk Calu 3 a jejich reakce na chemoterapeutické látky přispívá k širšímu výzkumu rakoviny plic a nabízí poznatky o účinnosti léčby a možnostech vývoje účinnějších léčebných strategií.

Organism

Člověk

Tissue

Adenokarcinom plic

Disease

Adenokarcinom plic

Metastatic site

Pleurální výpotek

Synonyms

CaLu-3, CALU-3, Calu 3, Calu3, CALU3

Charakteristika

Age

25 let

Gender

Muži

Morphology

Epitelové

Growth properties

Adherentní

Buňky Calu-3 | 305032

Regulační údaje

Citation	Calu-3 (katalogové číslo Cytion 305032)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0609

Biomolekulární data

Protein expression	Krevní skupina A, Rh
Antigen expression	Expres antigenů: Krevní skupina A, Rh
Tumorigenic	Ano

Zpracování

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/l NaHCO ₃ , w: EBSS (číslo článku Cytion 820100a)
Supplements	Doplňte médium o 10 % FBS a 1 % NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Odstraňte staré médium z adhezaních buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstředte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpustěte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.
Split ratio	1:2 až 1:4
Fluid renewal	2 až 3krát týdně

Buňky Calu-3 | 305032

Freeze medium

Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Thawing and Culturing Cells

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkumavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstředíte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujete.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělíte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5 % CO_2 , zvlhčená atmosféra.

Flask Coating

Pro optimální uchycení a životaschopnost po rozmrazení doporučujeme používat **baňky nebo destičky potažené kolagenem**.

Buňky Calu-3 | 305032

Freezing Procedure

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

Shipping Conditions

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

Sterility

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.