

## MDA-MB-435S sejtek | 300277

## Általános információk

## Description

**Jogi nyilatkozat: A szóban forgó sejtvonal szennyeződés miatt problémásnak bizonyult. Konkrétan az anyasejtvonal (MDA-MB-435) bizonyítottan az M14 sejtvonal származéka.**

Az MDA-MB-435S sejtvonal széles körben használt modell a rákkutatásban, eredetileg úgy gondolták, hogy egy mellrákos áttétből származik. Ezek a sejtek a rendkívül agresszív rákos sejtekre jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, beleértve a gyors proliferációs sebességet, az apoptózissal szembeni rezisztenciát és a környező szövetek inváziójának képességét. E tulajdonságok miatt az MDA-MB-435S sejteket gyakran használják a rákos áttétképződés, a gyógyszerrezisztencia mechanizmusainak és az agresszív daganatos viselkedés molekuláris hátterének vizsgálatában.

Érdekes módon a későbbi molekuláris és genetikai elemzések kimutatták, hogy az MDA-MB-435S sejtek genetikai profilja közelebb áll a melanomához, mint az emlőrákhoz, ami jelentős következményekkel jár a kutatásban való felhasználásukra nézve. Az ellentmondás ellenére továbbra is értékes modell maradnak az áttétképző folyamatok tanulmányozására és a potenciális terápiás szerek tesztelésére, különösen azokéra, amelyek az emlőrák és a melanoma közös mechanizmusait célozzák. A kutatóknak tanácsos figyelembe venniük ezeket a genetikai eredményeket az MDA-MB-435S sejtekkel végzett vizsgálatokból származó eredmények értelmezésekor.

## Organism

Emberi

## Tissue

Bőr

## Disease

Amelanotikus melanoma

## Metastatic site

Jobb fenék, hypodermis

## Synonyms

MDA-MB-435s, MDA-MB-435 S, MDA-MB-435-S, MDAMB435S, BrCL15

## Jellemzők

## Age

33 év

## Gender

Férfi

## Ethnicity

Európai

## Morphology

Pleomorf és többmagvú sejtek

## Growth properties

Adherent

## MDA-MB-435S sejtek | 300277

## Szabályozási adatok

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Citation             | MDA-MB-435S (Cytion katalógusszám: 300277) |
| Biosafety level      | 1                                          |
| NCBI_TaxID           | 9606                                       |
| CellosaurusAccession | CVCL_0622                                  |

## Biomolekuláris adatok

## A kezelése

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culture Medium       | DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glükóz, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM nátrium-piruvát, w: 1,2 g/L NaHCO <sub>3</sub> (Cytion 820400a cikkszám)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supplements          | A táptalajt 5% FBS-szel egészítjük ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dissociation Reagent | Accutase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subculturing         | Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak. |
| Fluid renewal        | hetente 2-3 alkalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Freeze medium        | Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kioltás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## MDA-MB-435S sejtek | 300277

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát  $-150^{\circ}\text{C}$  alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott  $37^{\circ}\text{C}$ -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a krioüklét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet  $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation  
Atmosphere**

$37^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , párasított légkör.

**Flask Coating**

A felolvasztás utáni optimális kötődés és életképesség érdekében **kollagénnel bevont lombikok vagy lemezek** használatát javasoljuk.

**Freezing  
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78^{\circ}\text{C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

### MDA-MB-435S sejtek | 300277

#### Shipping Conditions

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

#### Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

### Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

#### Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.