# Product sheet

## MDA-MB-453 | 305042

| | |
|---|---|
| **Description** | MDA-MB-453 AR ER<br>MDA-MB-453 / MDA-MB-453 |
| **Organism** | |
| **Tissue** | |
| **Disease** | |
| **Metastatic site** | |
| **Synonyms** | MDA-MB 453, MDA MB 453, MDA-MB453, MDAMB453, MDA-453, MDA453, MD - -453 |

| | |
|---|---|
| **Age** | 48 |
| **Gender** | |
| **Ethnicity** | |
| **Morphology** | |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | MDA-MB-453 305042 |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_0418 |

## MDA-MB-453 | 305042

| | |
|---|---|
| **Receptors expressed** | (FGF) |
| **Tumorigenic** | |
| **Culture Medium** | DMEM:Ham's F12 1:1 w: 3.1 g/L w: 2.5 mM L- w: 15 mM HEPES w: 0.5 mM w: 1.2 g/L NaHCO3 Cytion 8 |
| **Supplements** | 10% FBS |
| **Dissociation Reagent** | Accutase |
| **Subculturing** | PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5 |
| **Fluid renewal** | 2 3 |
| **Freeze medium** | FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100 |
| **Thawing and Culturing Cells** | 1.<br>2. -150°C 3<br>3. 37°C 40-60<br>4. 70%<br>5. 8 15<br>6. 300 x g 3<br>7. 10 T25 T25<br>8. |

## MDA-MB-453 | 305042

| | |
|---|---|
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, |
| **Shipping Conditions** | -78 °C |
| **Storage Conditions** | -150 -196 -80 °C |

## / /HLA

| | |
|---|---|
| **Sterility** | PCR |